

Révisions/Formulaire 01

Analyse : quelques révisions rapides, fonctions réelles d'une variable réelle.

- Pour chaque exercice, on évaluera si le résultat est illustrable par un graphique, un schéma et/ou un calcul informatique adéquat, à réaliser si le temps le permet.
- L'utilisation des « gros » théorèmes du cours (TVI, TAF, IPP, Chgt de variable dans intégrales) doit donner lieu à une rédaction dans les standards du concours.

Limites.

Exercice 1.— Déterminer la limite lorsque $x \rightarrow +\infty$ de $\sqrt{x}(\sqrt{x+1} - \sqrt{x})$. Montrer qu'il existe $A > 0$ tel que

$$\forall x \in [A, +\infty[, 0 \leq \sqrt{x}(\sqrt{x+1} - \sqrt{x}) \leq 1$$

Exercice 2.— Discuter suivant la valeur de $\alpha > 0$ la limite lorsque $x \rightarrow +\infty$ de $x^\alpha((x+1)^{\frac{1}{3}} - x^{\frac{1}{3}})$.

Exercice 3.— Discuter suivant les valeurs de $\alpha \in \mathbb{R}$ de la limite en $+\infty$ de la fonction $t \mapsto \frac{t^\alpha}{(1+t^2)^{\frac{\alpha}{3}}}$. (Donner un équivalent « simple »).

Exercice 4.— Rappeler les règles de calcul de limites croissances comparées.

Exercice 5.— Déterminer la limite lorsque $x \rightarrow +\infty$ de $xe^{-\sqrt{x}}$. Montrer que $xe^{-\sqrt{x}} = o(x^{-2})$ lorsque $x \rightarrow +\infty$.

Exercice 6.— Déterminer la limite lorsque $x \rightarrow +\infty$ de $xe^{-\sqrt{\ln x}}$.

Exercice 7.— Déterminer la limite lorsque $x \rightarrow 0$ de $\frac{\ln(1+x)-x}{x^2}$.

Limite monotone.

Exercice 8.— Énoncer le théorème de la limite monotone. On se limitera au cas du problème de la limite en $+\infty$ pour une fonction f définie sur un intervalle du type $[a, +\infty[$.

Exercice 9.— Montrer, sans tenter le calcul de l'intégrale, que la fonction f définie par

$$f(x) = \int_1^x \frac{dt}{(1+t^6)^{\frac{1}{3}}}$$

admet une limite en $+\infty$.

Indication: Majorer $f(x)$ par une constante en majorant simplement son intégrande.

Continuité et Dérivabilité.

Tangentes.

Exercice 10.— Rappeler la définition du nombre dérivé en x_0 d'une fonction f , réelle, de variable réelle. Rappeler le lien entre ce nombre et la tangente au graphe de f en x_0 . Dessin.

Exercice 11.— Donner l'équation de la tangente à la fonction $x \mapsto x \cdot \ln x$ en $x_0 = 1$. Etudier la position de cette tangente par rapport au graphe de la fonction.

Exercice 12.— Dans quel(s) cas, le graphe d'une fonction admet-il une (demi-)tangente verticale ? Donner un exemple de fonction dont le graphe admet une tangente verticale en $x_0 = 1$.

Composition.

Exercice 13.— Donner la définition du fait que f , une fonction de variable réelle, à valeurs réelles, est de classe \mathcal{C}^1 sur un intervalle $I \subset \mathbb{R}$.

Exercice 14.— Énoncer le théorème portant sur le caractère \mathcal{C}^1 d'une composition de deux fonctions.

Exercice 15.— Donner des (tous ?) intervalles de \mathbb{R} sur lesquels la fonction $x \mapsto |\sin(\pi \cdot x)|$ est de classe \mathcal{C}^1 . Cette fonction est-elle continue sur \mathbb{R} ? On écrira avec soin et méthode les arguments de composition. Tracer rapidement l'allure du graphe de cette fonction.

Exercice 16.— Donner une formule pour la dérivée de $t \mapsto \ln(\sqrt{t^2 - 1} + t)$. Vous pouvez mener le calcul formellement à la physicienne en posant de nouvelles variables comme $u = \sqrt{t^2 - 1} + t$, $v = t^2 - 1$... Pour quelles valeurs de t votre formule est-elle valable ?

Tableaux de variations, bijections.

Exercice 17.—

1. Donner le tableau de variations de $x \mapsto x^3 \cdot e^{-x}$.
2. Donner le tableau de variations de $x \mapsto x^6 \cdot e^{-x^2}$.
3. Donner le tableau de variations de $t \mapsto \frac{(\ln t)^3}{t}$.
4. Donner le tableau de variations de $x \mapsto \frac{1}{1+x^6 \cdot e^{-x^2}}$.

Tracer les graphes sur machine.

Exercice 18.— Soit $I = [0, 1]$ et $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe \mathcal{C}^2 de dérivée seconde positive.

1.a. Donner l'équation de la corde au graphe de f entre les points d'abscisses 0 et 1.

1.b. Montrer que le graphe de f est en dessous de cette corde.

1.c. Montrer que le graphe de f est au dessus de toutes ses tangentes.

2. Soit I un intervalle ouvert de \mathbb{R} , g une fonction de classe \mathcal{C}^2 sur I , de dérivée seconde positive sur I , $a < b$ deux points de I .

En considérant la fonction $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(t) = g(a + t \cdot (b - a))$, déduire de la question précédente des propriétés de position concernant le graphe de g , ses tangentes et ses cordes.

Exercice 19.— Déterminer, en discutant sur la valeur de $c \in \mathbb{R}$, du nombre de solutions de l'équation $\frac{3}{x^2} + x = c$ d'inconnue $x \in]0, +\infty[$.

Exercice 20.— Soient C, α deux nombres réels strictement positifs. Déterminer le minimum de la fonction $x \in]0, +\infty[\mapsto x^\alpha + \frac{C}{x}$.

Exercice 21.—

1. Montrer que la fonction $f : t \mapsto \ln(\sqrt{t^2 - 1} + t)$ définit une bijection de $[1, +\infty[$ sur un intervalle J à préciser.
2. Pour $y \in J$, $y = f(x)$, $x \geq 1$, calculer et simplifier $e^y + e^{-y}$ et $e^y - e^{-y}$.
3. Énoncer le théorème de dérivation d'une fonction réciproque et déterminer un sous-intervalle de J maximal sur lequel f^{-1} est de classe \mathcal{C}^1 . Donner une formule pour $(f^{-1})'$ sur cet intervalle.

Exercice 22.— La fonction arcsinus

1. Étudier la fonction sinus \sin sur l'intervalle $I = [-\frac{\pi}{2}, +\frac{\pi}{2}]$ et montrer que cette fonction définit une bijection de l'intervalle I sur un intervalle J à préciser. On note \arcsin la fonction réciproque de cette bijection. Il s'agit de la fonction *arc sinus*.
2. Tracer le graphe de \sin sur I et, sur un autre graphique, tracer celui de \arcsin sur J . Donner les valeurs de $\arcsin(0)$, $\arcsin(1)$, $\arcsin(-1)$, $\arcsin(\frac{\sqrt{2}}{2})$, $\arcsin(\frac{\sqrt{3}}{2})$.
3. Justifier que sur l'intervalle J , $\sin(\arcsin(y)) = y$ et $\cos(\arcsin(y)) = \sqrt{1 - y^2}$.
4. Justifier du caractère \mathcal{C}^1 de \arcsin sur l'intervalle $] -1, +1[$ et donner une formule pour sa dérivée. La fonction \arcsin est-elle dérivable à gauche en $+1$? Quelle est la traduction graphique de ce phénomène?
5. (Question de cours) Savez-vous faire le travail précédent en remplaçant la fonction \sin par la fonction tangente \tan ? Faire un résumé des résultats obtenus.

Développements limités.**Exercice 23.—**

1. Rappeler la formule de TAYLOR à l'ordre n en 0, en x_0 .
2. Donner les développements limités classiques. En faire une liste hiérarchisée.

Exercice 24.—

1. Comparer, au voisinage de 0, les fonctions $x \mapsto \sin(x)$ et $x \mapsto \tan(x)$.
2. Comparer, au voisinage de 0, les fonctions $x \mapsto \sin(2x)$ et $x \mapsto 2 \tan(x)$.

Exercice 25.— Justifier, avec le minimum de calculs, que le DL d'ordre 37 de $\tan(x^3 - x)$ ne comporte que des puissances impaires.

Calcul intégral**Croissance de l'intégrale****Exercice 26.—**

1. Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$0 \leq \int_0^1 \frac{t^n}{1+t^2} dt \leq \frac{1}{n+1}.$$

En déduire

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 \frac{t^n}{1+t^2} dt.$$

2. De même, calculer

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^{\pi/2} (\sin(n^3 t)) e^{-nt} dt.$$

Exercice 27.— Soit f une fonction de classe \mathcal{C}^1 sur $[0, 1]$. On pose, pour $n \in \mathbb{N}^*$,

$$I_n = \int_0^1 f(t) \cos(n.t) dt.$$

Par une intégration par parties, montrer que $I_n = O\left(\frac{1}{n}\right)$ et donner la limite de I_n lorsque $n \rightarrow +\infty$.

Ipp et récurrence.

Exercice 28.— On pose, pour $p, q \in \mathbb{N}$, $I_{p,q} = \int_0^1 x^p (1-x)^q dx$.

1. Calculer $I_{p,0}$ et $I_{0,q}$.

2. Donner une relation entre $I_{p+1,q-1}$ et $I_{p,q}$. En déduire une formule donnant $I_{p,q}$ à l'aide de factorielles.

Indication: On doit trouver $I_{p,q} = \frac{p!q!}{(p+q+1)!}$

Changement de variable

Exercice 29.— Énoncer le théorème de changement de variable pour une intégrale.

Exercice 30.— Donner une formule donnant, pour $p, q \in \mathbb{N}$,

$$J_{p,q} = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2p+1}(x) \cdot \sin^{2q+1}(x) dx$$

à l'aide de factorielles.

Indication: Se ramener par changement de variable à $I_{p',q'}$ de l'exercice 28 en posant $u = \sin^2(x)$.

Sommes de RIEMANN

Exercice 31.—

1. En utilisant les sommes de RIEMANN calculer $\int_0^1 x^2 dx$. On rappelle que $\sum_{i=1}^n i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$.

2. En utilisant les sommes de RIEMANN associées à des fonctions que l'on déterminera, calculer les limites des suites :

2.a. $S_n = \sum_{i=0}^{n-1} \frac{1}{n\alpha+i\beta}$ avec α et β deux réels strictement positifs.

2.b. $I_n = \frac{\sqrt{1} + \sqrt{2} + \dots + \sqrt{n}}{n\sqrt{n}}$.

Exercice 32.— On considère

$$S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{n(n+k)}}.$$

Montrer que (S_n) converge et déterminer sa limite.

Exercice 33.— $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n^4} \prod_{k=1}^{2n} (n^2 + k^2)^{\frac{1}{n}}$?

Techniques

Exercice 34.— Préciser l'ensemble de définition et déterminer les primitives des fonctions définies par :

$$f_1(x) = \tan^2 x, \quad f_2(x) = \tan x, \quad f_3(x) = \frac{1}{\sqrt{2-x}}, \quad f_4(x) = \frac{ax+b}{cx+d},$$

$$f_5(x) = |x^2 - 1|, \quad f_6(x) = \frac{1}{(x-5)^3}, \quad f_7(x) = \ln(4-x), \quad f_8(x) = |x|^{2/5}.$$

Exercice 35.— Préciser les intervalles sur lesquels les fonctions suivantes sont continues, puis en déterminer toutes les primitives sur chacun de ces intervalles.

$$f(t) = \frac{1}{t(\ln t)^3}, \quad g(x) = \arcsin x, \quad h(x) = \cos^3 x, \quad i(x) = \frac{1}{2 + \sin x}.$$

Exercice 36.— Déterminer A et B dans l'égalité suivante :

$$\frac{x}{x^2 - x - 2} = \frac{A}{x+1} + \frac{B}{x-2}$$

Calculer $\int_0^1 \frac{x}{x^2 - x - 2} dx$.

Exercice 37.— Calculer

$$\int_{-2}^2 \frac{1}{x^2 + 4x + 8} dx, \quad \int_0^1 \frac{2x^2 + 1}{x^2 + 1} dx$$

Exercice 38.— Calculer à l'aide d'une intégration par parties les intégrales suivantes :

$$I_1 = \int_{\pi/2}^{2\pi/3} (x \cos x + \sin x) \cdot \ln x \, dx, \quad I_2 = \int_1^{e^{\pi/2}} \cos(\ln x) \, dx, \quad I_3 = \int_1^e (\ln x)^3 \, dx.$$

Exercice 39.— Pour $(p, q) \in \mathbb{N}^2$, on pose :

$$I(p, q) = \int_0^1 x^p (1-x)^q dx.$$

1. Exprimer $I(p+1, q)$ en fonction de $I(p, q+1)$.
2. Calculer $I(0, q)$. En déduire $I(p, q)$ pour $(p, q) \in \mathbb{N}^2$.
3. En considérant, pour $n \in \mathbb{N}^*$ le polynôme

$$T(t) = \sum_{p=0}^n \binom{n}{p} t^p I(p, n-p),$$

retrouver le résultat de l'exercice 28.

Divers

Exercice 40.— Une cuve de fioul agricole, cylindrique, de rayon $R > 0$, de longueur $\ell > 0$ est emplie de fioul jusqu'à une hauteur¹ h avec $0 < h < 2R$ (ce que l'on peut voir sur une jauge extérieure). Le volume de fioul est noté $V(h)$.

1. Faire un dessin.
2. Pourquoi (réfléchir aux problèmes d'unités) peut-on mettre V sous la forme

$$V(h) = \ell \cdot R^2 \cdot a\left(\frac{h}{R}\right)$$

où $a : [0, 2] \rightarrow \mathbb{R}$ est une fonction indépendante de R, h, ℓ . Que valent $a(0), a(1), a(2)$?

3. Donner une formule intégrale pour $a(x)$ pour $0 \leq x \leq 2$. (On pourra tracer la réunion des graphes des fonctions $x \mapsto \pm \sqrt{1 - (x-1)^2}$.)

4. Vérifier que

$$\forall x \in [0, 2], a(x) = \frac{\pi}{2} + (x-1)\sqrt{x(2-x)} + \arcsin(x-1)$$

où la fonction arcsin est la fonction réciproque² de $\sin : \left[-\frac{\pi}{2}, +\frac{\pi}{2}\right] \rightarrow [-1, +1]$.

5. Ecrire une fonction Python `Volume(h, R=1, ell=1)` retournant le volume de fioul dans la cuve. Tracer la courbe représentative du volume en fonction de la hauteur. Indiquer abscisses et ordonnées importantes sur le graphe.

Exercice 41.— Justifier la bonne définition de chacune des intégrales suivantes, puis trouver leur valeur à l'aide du changement de variable indiqué :

$$\int_0^2 x\sqrt{x+1}dx, \quad \int_0^{\pi/2} \sin^2 x \cos^3 x dx, \quad \int_0^{\pi/3} \frac{\sin 2x}{1 + \cos x} dx, \quad \int_{-1}^1 \frac{dx}{1 + \sqrt{1+x}}.$$

On posera respectivement $u = x + 1$, $u = \cos^2 x$, $u = \cos x$ et $x = u^2 - 1$.

Exercice 42.— Soit f une fonction continue sur \mathbb{R} . On considère les fonctions suivantes :

$$\varphi_1(x) = \int_0^{\cos x} f(t)dt, \quad \varphi_2(x) = \int_x^{x^3} f(t)dt, \quad \varphi_3(x) = \int_x^{x^3} f(tx)dt.$$

1. Montrer que φ_1 et φ_2 sont des fonctions de classe \mathcal{C}^1 sur \mathbb{R} puis calculer φ_1' et φ_2' .
2. Montrer que φ_3 est continue en 0, de classe \mathcal{C}^1 sur \mathbb{R}^* puis calculer $\varphi_3'(x)$ si $x \neq 0$.
3. Montrer que $\varphi_3 \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R})$.

Exercice 43.— Pour tout entier naturel n on note :

$$f_n(x) = \frac{\cos nx}{\sin x}, \quad I_n = \int_{\pi/3}^{2\pi/3} f_n(x)dx.$$

1. Justifier la bonne définition de I_n . Rappeler les valeurs $\sin(\pi/3), \sin(2\pi/3), \tan(\pi/6), \tan(\pi/3)$.
2. Donner la valeur de I_1 .

1. L'axe de ce cylindre est parallèle au sol
2. On pourra commencer par étudier cette fonction, notamment montrer la formule

$$\forall x \in [-1, +1], \arcsin'(x) = (1 - x^2)^{-\frac{1}{2}}$$

3. Donner la valeur de I_0 . On pourra effectuer le changement de variable $t = \tan(x/2)$ en utilisant la relation $\sin x = 2t/(1+t^2)$.
4. n étant un entier naturel, simplifier $I_{n+2} - I_n$ en utilisant autant de fois que nécessaire la relation trigonométrique $\cos p - \cos q = -2 \sin((p-q)/2) \sin((p+q)/2)$.
5. En déduire la valeur de I_n lorsque n est impair.
6. Donner les valeurs de I_2 et de I_4 .

Exercice 44.— Pour un nombre réel x , on considère la formule

$$F(x) = \int_0^{\pi/4} \arctan(x \cdot \tan \theta) \, d\theta$$

1. Justifier que la fonction F est bien définie sur \mathbb{R} .
2. Donner la valeur de $F(0)$, de $F(1)$.
3. On admet que F est de classe \mathcal{C}^1 sur \mathbb{R} et que sa dérivée est donnée par

$$\forall x \in \mathbb{R}, F'(x) = \int_0^{\pi/4} \frac{\tan \theta}{1+x^2 \cdot \tan^2 \theta} \, d\theta$$

- 3.a. Justifier heuristiquement du caractère raisonnable de cette formule.
- 3.b. Calculer $F'(0)$.
- 3.c. Effectuer (en le justifiant) le changement de variable $u = \tan \theta$ dans cette intégrale et montrer que

$$\forall x \in \mathbb{R}, F'(x) = \int_0^1 \frac{u}{(1+x^2 \cdot u^2)(1+u^2)} \, du$$

- 3.d. Donner la valeur de $F'(\pm 1)$. 3.e. Pour $x \neq \pm 1$, vérifier la décomposition

$$\frac{u}{(1+x^2 \cdot u^2)(1+u^2)} = \frac{1}{(x^2-1)} \left(x \cdot \frac{x \cdot u}{1+(x \cdot u)^2} - \frac{u}{1+u^2} \right)$$

et en déduire une formule sans signe intégral pour $F'(x)$.